

# Gibberellik Asit GA3

Gibberellins Gibberellic Acid GA3, güçlü aktiviteye sahip bitki kaynaklı bir büyüme düzenleyicidir. Esas olarak bitkiye yapraklar, dallar, çiçekler, tohumlar veya meyveler yoluyla girer ve sapların, yaprakların ve meyvelerin dengeli bir şekilde büyümesini teşvik edebilen eylem için aktif parçalara iletilir. , Erkek ve dişi çiçeklerin oranını değiştirin, çiçek dökümünü ve meyve dökümünü azaltın ve daha uzun süre dayanın. ,

**CAS NUMARASI:**77-06-5

**Kimyasal ad:**Giberellin A3; Giberellinler;

GA3;2,7-dihidroksi-1-metil-8-metilen-13-okso-1,2,4b,5,6,7,8,9,10,10a-dekahidro-4a,1-(epoksimetano)-7,9a-metanobenzo[a]azulen-10-karboksilik asit

**Fiziksel ve kimyasal özellikler:**

Görünüm: Beyaz toz kristal

Ampirik Formül: C19H22O6

Molekül Ağırlığı:346,38

Erime noktası:223-225 °C

Toksisite ve tanımı: Hafif toksik

## Kullanım kapsamı ve nasıl kullanılacağı:

|                  |                                                  |                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Salatalık        | 50-100mg/L, çiçeklere püskürtün                  | Meyve ayarını iyileştirin; daha büyük meyveler üret            |
| Patlıcan         | 10-50mg/L, çiçeklere püskürtün                   |                                                                |
| Domates          | 10-50mg/L, çiçeklere püskürtün                   |                                                                |
| Üzüm             | 20-50mg/L, meyve salkımına püskürtün             |                                                                |
| Narenciye        | 20-40mg/L, çiçeklere püskürtün                   |                                                                |
| Patates          | 0,5-1 mg/L, 30 dakika yumru tedavisi             | Tohum çimlenmesini iyileştirin; uyku halini kırmak             |
| Arpa             | 1mg/L, tohum tedavisi                            |                                                                |
| Salatalık/karpuz | 10-50mg/L, hasattan önce meyvelere püskürtün     | Meyve depolama süresini uzatın; meyve yaşlanmasını geciktirmek |
| Muz              | 10mg/L, hasattan sonra meyve muamelesi           |                                                                |
| Kiraz            | 10mg/L, hasattan 20 gün önce meyvelere püskürtün |                                                                |

## Kullanım için teknik gereksinimler:

Az miktarda suyla çözün ve ardından istenen konsantrasyona kadar seyreltin. Artık kullanıma hazırdır ve uzun süre saklanamaz, aksi takdirde kullanım etkisi azalacaktır.Sprey tek tip olmalıdır.Alkali pestisitler, gübreler ve diğer maddelerle karıştırmaktan kaçının. Lütfen bu ürünü pestisitlerin güvenli kullanımına ilişkin yönergelerle uygun olarak kullanın. Cilt, göz temasından ve sisi solumaktan kaçının. Uygulama alanında sigara içmeyin veya yemek yemeyin. İçmeden, yemek yemeden ve sigara içmeden önce ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın. Püskürtme ve püskürtme sırasında eldiven, uzun elbise ve pantolon giyin; gözlere, cilde ve giysilere sıçramasını önleyin.Püskürtme işleminden sonra püskürtme ekipmanı iyice temizlenmelidir. Temizlik ekipmanlarından kaynaklanan atık sular nehir ve gölet gibi su kaynaklarına deşarj edilemez. Nehir ve gölet gibi su kütlelerinde ilaçlama ekipmanlarının temizlenmesi yasaktır. Atık uygun şekilde bertaraf edilmelidir ve istendiğinde atılamaz veya başka amaçlar için kullanılamaz.