

1-Naftalenasetik Asit NAA

1-Naftalitik Asit NAA, yardımcı benzeri bir madde ve bitki büyüme düzenleyicisidir. Hücre bölünmesini ve genişlemesini teşvik eder, Kılcal köklerin oluşumunu teşvik eder, meyve ayarını artırmak, meyve düşüşünü önlemek, dişi ve erkek çiçek oranını değiştirmek gibi endojen auxin işlev özelliklerine ve fizyolojik işlevlerine sahiptir. Bu ürün pestisit preparatlarının işlenmesi için hammadDEDİR.

ÜRÜN AYRINTILARI

1-Naftalaneasetik asit (NAA) Bitki büyüme regülatörü : 86-87-3

1-Naftalaneasetik asit (NAA) sadece hazırlık işlemleri için kullanılır ve doğrudan tarım arazilerinde veya diğer yerlerde kullanılamaz. Bu ürün, yardımcı benzeri bir maddedir, bitki büyüme düzenleyicisidir. Hücre bölünmesini ve genişlemesini teşvik eder, köklerin oluşumunu teşvik eder, meyve ayarını artırmak, meyve düşüşünü önlemek, dişi ve erkek çiçek oranını değiştirmek, erken olgunluğu teşvik eder ve verimi artırmak gibi işlevlere sahiptir. Kuraklık direncini, soğuk direncini, hastalık direncini, tuzluluk direncini ve mahsullerin stres direncini artırır. Naftalin asetik asit yapraklar, dalların yumuşak derisi ve tohumlar yoluyla bitki vücuduna girebilir ve besin akışı ile fonksiyonel parçalara taşınır.

CAS NO	86-87-3
Fiziksel ve kimyasal özellikler	Durum: Toz Saflık: 98%TC Görünüm: Beyaz toz Ampirik Formül: C ₁₂ H ₁₀ O ₂ Moleküler Ağırlık: 186.21 Erime Noktası: 141-143 °C
Çözünürlük	Suda çözünmesi zor, aseton, eter, benzen, etanol, kloroform ve diğer organik çözücülerde çözünür.

Uygulama

Meyve ağaçları çiçeklenmeyi teşvik eder, meyve düşmesini önler, olgunlaşmayı hızlandırır ve üretimi artırır. Düşen çiçekleri önler. Köklendirme yi teşvik eder.

Büyümeyi teşvik	Köklenmeyi teşvik etme: Köklenme, 6 cm ila 8 cm dalların tabanının kesim sırasında 100 mg ila 150 mg / l konsantrasyonda naftalenasetik asit çözeltisine batırılmasıyla indüklenebilir.
İndüklenmiş çiçek - meyve	Yapraklara 5 ila 10 mg/l naftalenasetik asit çözeltisi püskürtülerek erken çiçeklenme elde edilebilir. Meyvelerin ve çiçeklerin yüzeyindeki 50-100 mg/l naftalenasetik asit çözeltisinin konsantrasyonu ile eşit şekilde püskürtülür, meyvelerin yaşlanmasını geciktirebilir.
Çiçek hastalığını ve düşmeyi önleyin	Yüksek sıcaklık ve düşük ışık koşullarında çiçeklerin doğal dökülmesini azaltmak için ilk 7 günde çiçek ve yapraklara 50 mg/l NAA düzgün bir şekilde püskürtün.